

予防接種チェック表

氏名 _____

生年月日 平成・令和 年 月 日

	ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種間隔	第1回	第2回	第3回	第4回
定期 予防 接種	ロタウイルス (ロタリックス)	生	生後42日から生後168日まで ①-②の間は4週以上あけて計2回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	ロタウイルス (ロタテック)	生	生後42日から生後224日まで ①-②-③の間は4週以上あけて計3回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	B型肝炎	不活化	生後2ヵ月から 1歳未満 ①-②の間は4週以上 ②-③の間は4-6ヵ月程度	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	インフルエンザ菌b型 ^{注1} (ヒブワクチン)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ4週以上 ③-④の間は7ヵ月以上(標準は1年)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)
	肺炎球菌 ^{注1} (プレベナー13)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ4週以上 ③-④の間は60日以上かつ1歳越えて	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)
	4種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ3週以上 ③-④の間は6ヵ月以上(標準は1年)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)
	BCG (結核)	生	～12ヵ月未満 標準的には5-8ヵ月に接種	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	MR (麻疹・風疹)	生	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度(年長児)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	水痘ワクチン (水ぼうそう)	生	1歳以上3歳未満 ①-②の間は3ヵ月以上(標準6～12ヵ月)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	日本脳炎 ^{注2}	不活化	生後6ヵ月(標準は3歳)から ①-②の間は1週以上 ②-③の間は6ヵ月以上(標準およそ1年) ④9歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化	①11歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	ヒトパピローマウイルス感染症予防 (子宮頸がん予防)	不活化	小学6年生から高校1年生	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
ムンプスワクチン ^{注3} (おたふくかぜ)	生	①1歳以上 ②は年長児での接種を推奨	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			

注1 : 生後7ヵ月以降に接種を開始した場合は接種回数が異なります。詳細は、かかりつけ医に相談してください。

注2 : 日本脳炎の特例 (平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた20歳未満の方は、7歳6ヵ月～9歳未満、13歳以上でも接種可能となっています)

注3 : MRワクチンと同様に1歳過ぎに1回目を接種します。その後2回目を接種することにより、さらに良好な予防効果を得られると考えられています。